

カリフラワー品種特性表

サカタ交配

品 種	項 目	熟 期		草 姿	花 蕾			耐暑性	耐寒性	株数/10a
		早生性	定植後(日)		重量(g)	色	包葉			
オーナメントホワイト		中早生	85	立	900※1	純白	極良	強	やや強	3,600
バージンロード		極早生	60	立	700※1	純白	やや良	極強	弱	3,500~4,000
パロック		早生	秋どり:75	やや開	900※1	白	良	やや強	やや強	3,600
	初夏どり:65									
ブライダル		中早生	秋冬どり:85	やや立	900※1	白	やや良	中	やや強	3,600
	初夏どり:75									
美星®		早生	65~75	立性 コンパクト	350※2	純白	極良	極強	弱	6,660
オレンジ美星		早生	65	やや開 コンパクト	350※2	オレンジ	なし	強※3	やや弱	6,660

※1 収穫径14~15cm時 ※2 収穫径10cm時 ※3 高温期には発色が薄くなる場合があります

カリフラワー栽培型と適応品種

栽培地	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適 応 品 種	備 考	
高冷地 冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	} オーナメントホワイト ブライダル、パロック } パロック } バージンロード } 美星 } オレンジ美星	標高や緯度によって、播種期が異なります。地域にあった播種期を選びましょう。	
						●	●	●	●	●	●	●				
								●	●	●	●	●	●			
									●	●	●	●	●			
										●	●	●	●			
一般地														} ブライダル } オーナメントホワイト ブライダル、パロック } バージンロード } 美星 } オレンジ美星	「美星」と「オレンジ美星」は熟期が異なるので、収穫期を合わせるためには、「美星」を早めにまくようにします。	
暖 地														} ブライダル } オーナメントホワイト ブライダル、パロック } バージンロード } 美星 } オレンジ美星	「美星」と「オレンジ美星」は熟期が異なるので、収穫期を合わせるためには、「美星」を早めにまくようにします。	

(注) 日数は掛川総合研究センター(静岡県)における適作型での定植後の日数です。