

ハウスメロン品種特性表

サカタ交配

品 種	項 目	草勢	着果性	成熟日数 (開花後)	果重 (kg)	果皮色	果形	ネット	肉色	糖度 (%)	メロンうどんこ病 抵抗性※	メロンつる割病 抵抗性
アンデス		やや強	◎	55	1.0~1.3	灰緑	やや偏球~球	◎	黄緑	13~15	○	レース0 レース2
マルセイユ		やや弱	◎	50~55	1.1	灰緑 (ストライプ)	球	◎	橙	15~17	◎	レース0 レース1 レース2
シグナス		強	◎	57~58	1.0~1.5	灰緑	球~やや高球	◎	黄緑	14~16	○	レース0 レース2

※ メロンうどんこ病抵抗性の強さ(ただしレースによっては発病する) ◎>○>×

マクワ型メロン品種特性表

サカタ交配

品 種	項 目	台木 適応性	草勢	着果性	早生性	裂果	果重 (g)	果皮色	果形	果肉の 硬軟	芳香	肉色 (赤み)	糖度 (%)	メロンうどんこ病 抵抗性※2	メロンつる割病 抵抗性	比較
プリンス		広い	中	極良	早生	少	500~ 600	灰白	球	軟	多	濃	15~ 17	×	×	
プリンス PF6号		狭い	中	極良	早生	少	600~ 700	灰白	球	軟	多	やや 濃	14~ 15	○	レース0 レース1 レース2	「プリンス」より一回り 大きい。短期決戦型。
プリンス PF		広い	強	良	中生	中	600~ 700	※1 灰白	高球	硬	少	中	15~ 17	○	レース0 レース1 レース2	肌がきれい。 長期どり可。
リゾート		狭い	中	良	中生	少	800~ 900	濃黄	高球	やや 硬	少	白	15~ 16	○	レース0 レース2	多収品種。ハウス~ トンネル栽培に向く。

※1「プリンス」に比べ白い ※2 メロンうどんこ病抵抗性の強さ(ただしレースによっては発病する) ◎>○>×

(注)日数は掛川総合研究センター(静岡県)における適作型での日数です。