

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

適用病害と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※		
				本剤	ベンチアバリカルブイソプロピル	TPN
トマト	葉かび病	1000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内	6回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
	疫病	1000~1500倍				
ミニトマト		1500倍		2回以内		2回以内
きゅうり	べと病	1000~1500倍		3回以内		10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)
	褐斑病、うどんこ病、黒星病	1000倍				
なす	褐色腐敗病、すすかび病			4回以内	4回以内	4回以内
たまねぎ	べと病、白色疫病、灰色かび病		収穫7日前まで	3回以内	3回以内	6回以内
ねぎ	べと病、葉枯病		収穫14日前まで			4回以内(土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)
らっきょう	白色疫病					3回以内
アスパラガス	疫病	1500倍	収穫前日まで			4回以内
ばれいしょ		750~1000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	5回以内
	夏疫病	1000倍				
はくさい	べと病、白さび病、黒斑病、白斑病			2回以内	3回以内	3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
すいか	褐色腐敗病、炭疽病		収穫3日前まで	5回以内	5回以内	5回以内
メロン	べと病、つる枯病					
かぼちゃ	べと病、疫病、うどんこ病		収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3回以内
キャベツ	べと病		収穫14日前まで	2回以内	2回以内	3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)
だいず	茎疫病、べと病、紫斑病		収穫21日前まで			2回以内
ブロッコリー	べと病		出蕾前(但し、収穫21日前まで)		3回以内	3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内)

- 使用液量:100~300ml/平方メートル
- 使用方法:散布。
- 2018年11月7日付:ばれいしょ、だいずの変更。ブロッコリーの追加。
- 2019年12月18日付:きゅうりの変更。

効果・薬害等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- あんずに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)