

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。
(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

適用害虫と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用量★	使用時期※	総使用回数※	使用方法
キャベツ	コオロギ、ダンゴムシ	3~4kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	株元散布
はくさい	ハスモンヨトウ、 ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫21日前まで		
	コオロギ、ダンゴムシ	3~4kg/10a			
だいこん	ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫30日前まで	4回以内	
たばこ			移植時		本剤:1回、NAC:2回以内

本剤約30粒(4~7mmのもの)で約1gです。

※使用量の単位の読み替え方:「kg/10a」=「g/平方メートル」(例:3~4kg/10a=3~4g/平方メートル)

効果・薬害等の注意

- たばこの芯葉に付着しないように注意してください(薬害)。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)