

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

## 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びマラソンを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
花き類・観葉植物	アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類	2,000倍	100～300ml/ 平方メートル	発生初期	散布	6回以内
きく	ヨトウムシ類					
サルビア	オンブバッタ					
マリーゴールド	ハモグリバエ類					
トマト、ピーマン、かぼ ちや、すいか	アブラムシ類、ハダニ類			収穫前日まで		5回以内
なす						6回以内
きゅうり、メロン	ウリハムシ	1,000倍				3回以内
にがうり	アブラムシ類					
うり類(漬物用)	アブラムシ類、ハダニ類	2,000～ 3,000倍				
	ウリハムシ	1,000倍				
いちご	アブラムシ類、ハダニ類、ミカン キイロアザミウマ	2,000倍	収穫3日前まで	5回以内		
レタス	アブラムシ類					
キャベツ、はくさい	アブラムシ類、アザミウマ類				収穫前日まで	
	アオムシ、カブラハバチ	1,000倍				
カリフラワー、ブロッコ リー	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000倍	収穫3日前まで			
	アオムシ	1,000倍				
だいこん	アブラムシ類	2,000倍	収穫14日前まで	6回以内		
	アオムシ、ナモグリバエ	1,000倍				
ねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000倍	収穫7日前まで			
	ネギハモグリバエ	1,000倍				
たまねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000倍				
	ハモグリバエ類	1,000倍				
にんじん	アブラムシ類、キアゲハ、ヤサイ ゾウムシ	2,000倍	収穫14日前まで	4回以内		
ほうれんそう	アブラムシ類	2,000倍	100～300ml/ 平方メートル	収穫14日前まで	4回以内	
かぶ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※			
豆類(未成熟)	アブラムシ類、ハダニ類、コガネムシ類、アザミウマ類、インゲンテントウ	2,000倍	100～300ml/ 平方メートル	収穫7日前まで	散布	3回以内			
	ハモグリバエ類、カメムシ類、マメシンクイガ	1,000倍							
だいず、あずき、えんどうまめ、いんげんまめ	アブラムシ類、ハダニ類、コガネムシ類、アザミウマ類	2,000倍							
	ハモグリバエ、マメシンクイガ	1,000倍							
ぶどう	アブラムシ類、ハダニ類	2,000倍	200～700ml/ 平方メートル				収穫14日前まで	散布	6回以内
おうとう	アブラムシ類								本剤: 5回以内、マラソン:5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内)
びわ	アブラムシ類								5回以内
うめ	アブラムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類								
りんご	アブラムシ類、ハダニ類、リンゴワタムシ			本剤:5回以内、マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内)					
もも	アブラムシ類、ハダニ類カイガラムシ類			収穫7日前まで	5回以内				
かんきつ(なつみかんを除く)	アブラムシ類、ハダニ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類			収穫14日前まで					
かき	ハマキムシ類、カイガラムシ類、イラガ類		収穫30日前まで	4回以内					

## 効果・薬害等の注意

- アルカリ性薬剤、銅剤との混用はさけてください。
- 衛生害虫の駆除には使用しないでください。
- ミカンキイロアザミウマに使用する場合、多発生時には効果が劣ることがありますので、初発生をみたら直ちに散布してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病虫害防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)