

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。
(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

適用雑草と使用方法

※印は本剤及びMCPPを含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示します。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数※	使用方法
日本芝 (こうらいしば)	-	一年生広葉 雑草	雑草生育期	100～200ml/平方メートル (原液散布)	3回以内	雑草茎葉散布
西洋芝 (ケンタッキーブルー グラス)			春夏期 雑草生育期	150～200ml/平方メートル (原液散布)		
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動 場、宅地、のり面等	スギナ	雑草生育期 (草丈30cm以下)	75～200ml/平方メートル (原液散布)		植栽地を除く樹木等の周辺 地に雑草茎葉散布

効果・薬害等の注意

- 生育期の広葉雑草に有効なので、雑草の発生後生育期(草丈30cm以下)に茎葉に均一に散布してください。
- 散布後の降雨は効果を減ずるので、天候を見定めてから散布してください。
- 低温時(18℃以下)の散布は、効果が劣るのでさけてください。
- キク科雑草及びイネ科雑草には効果が劣るので、それらの優占する所では使用をさけてください。
- 本剤使用により芝に黄変等の薬害を生ずることがありますが、やがて回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。
- 草花、植木等周辺の植物には薬害を生ずるおそれがあるのでかからないように注意して散布してください。
- ケンタッキーブルーグラスに使用する場合、発芽直後やターフ形成の不十分な状態では使用しないでください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)