

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。  
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。  
(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

## 使用量の目安

使用時期	使用間隔	使用回数	使用量(各花房1回当り)	使用方法
各花房の開花時～幼果期 (果実がピンポン球ぐらいになるまで)	1週間に1回	1花房につき3～4回	20～30ml (約20～30プッシュ)	散布

- 尻腐れ症の予防効果は土壌環境(pH、乾湿)、生育温度、肥培管理など生育条件によって変動します。
- 本品はカルシウム成分を含みますが、チッ素、リン酸、カリなどの肥料成分は含んでいません。トマトの栽培には必ず肥料(マイガーデンベジフル、ベジフル液肥など)を与えてください。

### 注意事項

- 飲み物ではないので飲まないでください。
- 眼に入った場合、皮膚に付着した場合は水で洗い流してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 衣服等に付着すると汚れの原因となるので注意してください。
- 家具、金属製品、大理石、御影石、コンクリート等に液が付着すると変色するおそれがあるので注意してください。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)