薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
最新の適用病害虫名・対象作物名については、メーカーのホームページをご参照、または、お問い合わせください。
（こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です）

ベニカＶフレッシュスプレー

有効成分：還元澱粉糖化物…0.60%
クロチアニジン…0.0080%
マンデストロビン…0.020%
農林水産省登録　第 24118 号

※印は収穫物への残留回以内避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回以内数の制限を示します。

<table>
<tr><th rowspan="2">作物名</th><th rowspan="2">適用病害虫名</th><th rowspan="2">使用時期※</th><th colspan="3">総使用回以内数※</th></tr>
<tr><th>本剤</th><th>ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ</th><th>ﾏﾝﾃﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝ</th></tr>
<tr><td>トマト、ミニトマト</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、うどんこ病</td><td rowspan="5">収穫前日まで</td><td rowspan="5">3 回以内</td><td rowspan="4">4 回以内(但し、育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)</td><td rowspan="12">3 回以内</td></tr>
<tr><td>なす</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾊﾀﾞﾆ類、ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類、ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ類、うどんこ病</td></tr>
<tr><td>きゅうり</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、ｳﾘﾊﾑｼ、うどんこ病</td></tr>
<tr><td>メロン</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td></tr>
<tr><td>すいか</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、うどんこ病</td><td>4 回以内(但し、定植時の土壌混和は 1 回以内、散布は 3 回以内)</td></tr>
<tr><td>キャベツ</td><td>ｱｵﾑｼ、菌核病</td><td rowspan="2">収穫 7 日前まで</td><td rowspan="4">2 回以内</td><td>3 回以内(但し、定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 2 回以内)</td></tr>
<tr><td>レタス</td><td rowspan="2">ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td><td rowspan="4">5 回以内(但し、定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 2 回以内、定植後の株元散布は 2 回以内)</td></tr>
<tr><td>リーフレタス</td><td rowspan="3">収穫 3 日前まで</td></tr>
<tr><td>はくさい</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｱｵﾑｼ</td></tr>
<tr><td>こまつな、しゅんぎく</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td><td rowspan="2">3 回以内</td><td rowspan="2">4 回以内(但し、は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 3 回以内)</td></tr>
<tr><td>みずな</td><td>ﾀﾞｲｺﾝﾊﾑｼ</td><td>収穫 7 日前まで</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>いんげんまめ</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td><td>収穫
前日まで</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">3 回以内</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>さやえんどう</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾊﾀﾞﾆ類</td><td rowspan="2">収穫
3 日前まで</td></tr>
<tr><td>えだまめ</td><td>ｶﾒﾑｼ類</td><td>4 回以内（但し、は種時の処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内）</td></tr>
<tr><td>うめ</td><td>ｹﾑｼ類</td><td>収穫
前日まで</td><td rowspan="4">3 回以内</td><td rowspan="5">3 回以内</td></tr>
<tr><td>かき</td><td>ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類</td><td>収穫
7 日前まで</td></tr>
<tr><td>ぶどう</td><td>ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類、
ｺｶﾞﾈﾑｼ類成虫</td><td rowspan="3">収穫
前日まで</td></tr>
<tr><td>りんご、
なし</td><td>ｹﾑｼ類、うどんこ病</td></tr>
<tr><td>おうとう</td><td>ｶﾒﾑｼ類</td><td>2 回以内</td><td>2 回以内</td></tr>
<tr><td>すもも★1</td><td rowspan="2">ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td><td>収穫
3 日前まで</td><td rowspan="2">3 回以内</td><td rowspan="2">3 回以内</td></tr>
<tr><td>もも、
ネクタリン</td><td>収穫
7 日前まで</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">作物名</td><td rowspan="2">適用病害虫名</td><td rowspan="2">使用
時期※</td><td colspan="3">総使用回以内数※</td></tr>
<tr><td>本剤</td><td>ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ</td><td>ﾏﾝﾃﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝ</td></tr>
<tr><td>花き類･観葉植物
(ばらを除く)</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類</td><td rowspan="5">発生
初期</td><td rowspan="2">4 回以内</td><td rowspan="2">4 回以内</td><td rowspan="2">4 回以内</td></tr>
<tr><td>ばら</td><td>ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾁｭｳﾚﾝｼﾞﾊﾊﾞﾁ、ｱｻﾞﾐｳﾏ類、うどんこ病、黒星病</td></tr>
<tr><td>樹木類
（つつじ類、まさき、さるすべりを除く）</td><td>ｹﾑｼ類</td><td rowspan="2">6 回以内</td><td rowspan="2">6 回以内</td><td rowspan="2">6 回以内</td></tr>
<tr><td>つつじ類</td><td>ｹﾑｼ類、ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ</td></tr>
</table>

まさき、 さるすべり	ｹﾑｼ類、うどんこ病				

●希釈倍数：原液　●使用方法：散布　●還元澱粉糖化物の総使用回以内数※：－

「おうとう」はさくらんぼのことです。　★1「すもも」にはプラム、プルーン等が含まれます

●効果・薬害等の注意

①体調のすぐれない時は散布しないでください。
②人に向かって噴射しないでください。
③ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用してください。
④風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
⑤使用後の空容器は３回以上洗浄してから処理してください。

●安全使用上の注意

①使用前に容器をよく振ってください(沈殿)。
②使用に当っては使用方法などを誤らないよう注意してください。
③花き類に使用する場合、花弁に薬液が飛散すると変色等の症状が出るおそれがあるので、花にかからないように注意してください。
④適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

薬剤の使用に関する注意事項