

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参考、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年6月現在の内容です)

石原フロンサイド粉剤

有効成分：フルアジナム…0.50%

農林水産省登録 第17559号

作物名	適用病害名	使用量★	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の使用回数
キャベツ	根こぶ病	15 ~ 20kg/10a	2回以内 (但し、苗床では1回以内、本圃では1回以内)	作条土壤混和	3回以内(但し、苗床では1回以内、本圃での土壤混和は1回以内、土壤散布は1回以内)	
		30 ~ 40kg/10a				
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、菌核病	40kg/10a		全面土壤混和		
はくさい	黄化病、根こぶ病	30 ~ 40kg/10a	は種又は定植前	2回以内(但し、土壤混和は1回以内、土壤散布は1回以内)	2回以内(但し、土壤混和は1回以内、土壤散布は1回以内)	
		15 ~ 20kg/10a				
カリフラワー、ブロッコリー	根こぶ病	30 ~ 40kg/10a	1回	作条土壤混和	1回	
非結球あぶらな科葉菜類(ケール、こまつな、みずな、のざわな、なばな類を除く)、メキヤベツ、かぶ						
こまつな	根こぶ病、立枯病(リゾクトニア菌)	30kg/10a	は種前			
みずな	根こぶ病	30 ~ 40kg/10a	は種又は定植前	全面土壤混和	1回	
のざわな						
		20kg/10a		作条土壤混和		

なばな類		15 ~ 20kg/10a			作条土壤混和		
		30 ~ 40kg/10a					
かんしょ	基腐病	40kg/10a	植付前		全面土壤混和	3回以内(但し、植付前は1回以内、植付後は2回以内)	
ぱれいしょ	そうか病、粉状そうか病	30 ~ 40kg/10a				6回以内(但し、種いも浸漬は1回以内、植付前の土壤混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)	
レタス、非結球レタス	すそ枯病、ビッグペイン病	30kg/10a	は種又は定植前			2回以内(但し、土壤混和は1回以内、土壤散布は1回以内)	
たまねぎ	黒腐菌核病、紅色根腐病、べと病	40kg/10a	定植前			7回以内(但し、全面土壤混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)	
ねぎ	白絹病、小菌核腐敗病	15kg/10a	土寄せ時 (但し、収穫21日前まで)	2回以内	株元散布	2回以内	
にら、にら(花茎)	白絹病	20kg/10a	収穫30日前まで	1回		1回	
らっかせい			収穫45日前まで				
だいこん	亀裂褐変症 (リゾクトニア菌)	30 ~ 40kg/10a	は種前		全面土壤混和	7回以内	
チューリップ	葉腐病		植付前				

	条斑病、微斑 モザイク病	40kg/10a				
ゆり	茎腐症(リゾ ープス菌によ る)		定植前			3回以内
てんさい	叢根病	育苗培土 1kg 当り 5 ~10g	は種前	土壌混和	5回以内(但し、は種前 の土壌混和及び苗床 灌注は合計1回以内、 株元散布及び散布は 合計4回以内)	

★使用量の単位の読み替え方：「kg/10a」 = 「g/m²」（例 30~40kg/10a=30~40g/m²）

- ・2018年10月10日付：キャベツの変更
- ・2021年09月08日付：てんさい、非結球あぶらな科葉菜類の変更
- ・2022年03月17日付：かんしょの追加
- ・2023年06月07日付：かんしょの変更
- ・2023年12月06日付：非結球あぶらな科葉菜類の変更。たまねぎ、なばな類の追加

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)